



أفبيوكس®

لقاح حي مجفد مكون من فيروس جدري الدواجن
عتره HP-2

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد على:
المادة الفعالة:
- على الأقل على 1×10^{10} TCID₅₀ من فيروس مرض جدري الدواجن المضعف المحضّر من عتره HP-2.
- المكونات الأخرى:
لاكتور، حليب مجفد خالي الدسم.

الإستطبابات:

يعمل لقاح لتحصين دجاج الأمهات والبياض وطيور الحبش (الرومي) ضد مرض جدري الدواجن.

مخاير الإستخدام:

يمنع تحصين الطيور المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

لا يوجد.
إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

النوع المستهدف:

الدواجن وطيور الحبش (الرومي).

الجرعة:

طريقة وخذ الجناح:

يتم غمس الأطراف المعدنية من الإبرة الخاصة بمحلول اللقاح ومن ثم ثقب جلد زاوية الجناح من خلال الجزء الذي يحتوي على أقل عدد من الأوعية الدموية على العمر بين ١٧ و ١٤ اسبوع.

برنامج التحصين:

- المناطق الموبوءة بالمرض: الجرعة الأولى على عمر ٤ اسابيع والثانية المعززة بعد ثلاث اشهر من الأولى.
- يحل اللقاح في المحلول المخصص المرفق.
- تحصين الدجاج: غمس الإبرة الخاصة بمحلول اللقاح ومن ثم يتم ثقب جلد زاوية الجناح.
- تحصين الحبش (الرومي): غمس الإبرة الخاصة بمحلول اللقاح ومن ثم يتم ثقب الجلد في منتصف الفخذ.

طريقة الإستخدام:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المظهورات.

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبردا (٢م° - ٨م°).
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.
- يجب إستخدام اللقاح خلال ساعتين بعد اذابة اللقاح.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأنصاف

المستهدفة:

تحصين الطيور السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الاحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان ولكن توخي الحذر من الحقن العرضي.

الإستخدام خلال فترة الوضع، الخصوبة:

يمكن أن يستخدم خلال فترة انتاج البيض.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي بيطري آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الزائدة:

في حال حقن ١٠ أضعاف التركيز: لا يوجد أي آثار جانبية.
إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

معلومات إضافية:

جدري الدواجن يعتبر من الأمراض الشائعة في الدواجن والحبش وطيور الدرغ وطيور الزينه والطيور البرية . المسبب للمرض هو فيروس جدري العائلة الطيرية ويوجد عترات عديدة حسب إصابة نوع الطيور ولكن يوجد بينها مناعة تصالبيه. الأعراض الخارجية للمرض إما جلدية أو تصيب الأغشية المخاطية (الجدري الربط)أو كليهما. السيطرة على المرض تكون بواسطة اللقاح الحي المضعف.

التعبئة:

علبة تحتوي على:

- زجاجات سعة: ٢٠٠ جرعة، ٥٠٠ جرعة، ١٠٠٠ جرعة، ٢٠٠٠ جرعة، ٢٥٠٠ جرعة.
- زجاجة المحلول.
- إبرة خاصة لثقب الجلد.

الإستعمال البيطري فقط.