



جوفاك ن دي في لاسوتا®

لقالح دي مجعد مكون من فيروس نيوكاسل عنزة لاسوتا

الاحتياطات الخاصة التي يجب اتخاذها
الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:
اللقالح لا يسبب مرض للإنسان ولكن يجب الانتباه من ملامسة اللقالح للعيون، في حالة حدوث ذلك عليك مراعاة الطبي.

الاستخدام خلال فترة وضع البيض، الخصوبة:
يمكن أن يستخدم خلال فترة إنتاج البيض.
التعامل مع المستحضرات الطبية الأخرى:
لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقالح عند استخدامه مع أي منتج طبي ببطري آخر يجب أخاذ قرار باستخدام هذا اللقالح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي ببطري آخر كل حالة على حدة.
الجرعة الزائدة:
في حال حقن ١٠ أضعاف التركيز:
أعراض تنفسية طفيفة تختفي في غضون أيام قليلة.
إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبي.

احتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقالح:
يجب التخلص من أي منتج طبي ببطري غير مستخدم أو مواد ثانية مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمطالبات المحلية.

معلومات اضافية:
يعتبر مرض النيوكاصل من أهم الأمراض الوبائية الخطيرة، والطريقة المثلثية للسيطرة عليه هو التحسين بواسطة اللقالح الحي لبناء مناعة موضوعية وعامة لحماية الطير من المرض والنفوق بسبب مرض النيوكاصل.

التعبيبة:
زجاجات سعة: ٣٠٠ جرعة، ٥٠٠ جرعة، ١٠٠٠ جرعة، ٢٥٠٠ جرعة.

للإستعمال البيطري فقط.

يعطي اللقالح في الصباح الباكر أو عندما يكون الشخص بارداً في الأيام الحارة.

- يخفف اللقالح في كمية ذاتية من مياه الشرب بحيث تستهلك كامل الكمية خلال ساعة إلى ساعتين حسب عمر الطير وطبيعة الجو على النحو التالي:

العنوان: ٢ - ٣ أسابيع

يخفف اللقالح ١٠٠ جرعة في ١٠ لتر ماء

عمر ٧ أسابيع

يخفف اللقالح ١٠٠ جرعة في ٢٠ لتر ماء

عمر ١٤ أسبوع فما فوق

يخفف اللقالح ١٠٠ جرعة في ٤٠ لتر ماء

بواسطة الرش الرادياني:
برش اللقالح بمقدار ٤٠-٣٠ سم

- مستعملة مرشًا ضاغطًا مناسبًا بولد رشا خشنا.
- يدشن الطير وتغلق النواواف والمراوح

- والفتحيات والإضافة في الطاولت وبعد فتحها وتشغيلها بعد الرش بعشرين دقيقة.

- الكمية الكافية من مياه المقطور لكل ١٠٠

جرعة هي كما يلى:

٢٠٠

٣ أسابيع من العمر

٤٠٠

٤ أسابيع من العمر

٥٠٠

الطيور البالغة

نصائح طريقة الاستخدام:

- يحضر اللقالح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المطهرات.

- عند الحقن بواسطة مياه الشرب تعطش اللطير لمدة ٢-١٣ ساعة قبل التحسين عن طريق مياه الشرب.

- يجب إعطاء اللقالح للطير خلال ساعتين بعد إدابة اللقالح.

فترقة السحب:

صغر بوص.

احتياطات التخزين الخاصة:

يحفظ مبردًا (-١٨°C).

- يحفظ بعيداً عن أشعه الشمس المباشرة.

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

- صلاحية اللقالح قد تم استنشاقها من قبل الطير.

- يجب استخدام اللقالح خلال ساعتين بعد إدابة

اللقاح.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف المستهدفة:

تحسين الطير السليمية فقط.

احتياطات خاصة للاستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيقات.

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

تحتوي كل جرعة من اللقالح المجعد على:

- البادلة الفcaleلة:

- على الأقل على EID₅₀ ٦٠٠١٠ على الأقل على EID₅₀ ٦٠٠١٠ من فيروس مرض

- نيوكاسل الضغط المحيض من عنزة لاسوتا.

- المكونات الأخرى:

- لاكتوز، حليب مجفف خالي الدسم.

الإستطبابات:

يعطي لقالح جوفاك ن دي في لاسوتا لتحسين الدواجن ضد مرض النيوكاصل.

محدود الإستخدام:

يمنع تحسين الطير المريضية أو المجهدة.

ردد الفعل السلبية:

نادرة؛ أعراض تنفسية طفيفة تختفي في غضون أيام قليلة.

إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبي.

النوع المستهدف:

الدواجن.

الجرعة:

برنامجه التحسين:

- جرعة واحدة لكل طير.

- التحسين كجرعة داعمة لاستجابة المناعية للطير بعد ٣-٢٠٠١٠ أسبوع من التحسين الأولى للطير بلقاح جوفاك ن دي في كلون أو جوفاك ن دي في B1.

- في المناطق الموبوءة بمرض النيوكاصل يعاد التحسين شهرياً.

طريقة التحسين:

الحقن بالعنق/ الأنف:

- يدآب اللقالح في محلول فيسيولوجي (٣٠ مل) ويعطى باستخدام قطارة معايرة. يقطع قطرة واحدة من اللقالح في عين واحدة وفتقة أنتفية واحدة من كل طير. يجيب على الشخص الذي

- يقوم بحقن اللقالح عن طريق الأنف التأكد بأن نقطنة اللقالح قد تم استنشاقها من قبل الطير.

- استخدم اللقالح فوراً بعد إداته (داخل ساعتين في طرف باردة).

بواسطة مياه الشرب:

- يدل اللقالح في ماء بارد ونظيف، وحالى من المطهرات مع آضفه بودرة الحليب الخالي من الدهن (غم / ل) لتنبيت فعالية اللقالح.

- يجب أن لا تزيد درجة ماء الشرب التي تحتوي على اللقالح عن ٢٠-١٥ °C.

- ينصح أن تعطش الطير قبل التحسين (٢-١ ساعه).

اسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenter.com, www.jovaccenter.com