



جوفاً زيت ا®

لقاح زيتي معطل للحقن يحتوي على فيروس النيوكاسل

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- يحتوي كل جرعة من اللقاح على:
- المادة الفعالة:
- على الأقل $EID_{50}^{١٠٠}$ من فيروس نيوكاسل عترة لاسوتا المعطل.
- المكونات الأخرى:
- سبان ٨٠، تويين ٨٠، ثايوميرسال، المادة المنشطة للمناعة.

الإستطبيات:

لإعطاء مناعة جيدة للدواجن ضد مرض النيوكاسل.

مخاطر الإستخدام:

يمنع تحصين الطيور المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

نادرة: حدوث تفاعل طفيف في موضع الحقن. إذا لاحظت أي آثار جانبية، حتى تلك الغير مرجحة في هذه النشرة أو كنت تعتقد أن اللقاح لم يعطي النتائج المرجوة، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

النوع المستهدف:

الدواجن والديك الرومي.

الجرعة:

- التحصين: إحقن جرعة واحدة لكل طير؛ ٠,٣ مل تحت الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة الصدر أو الفخذ.
- الدجاج:
- التحصين الأول: على عمر ٣ أسابيع أو أكثر.
- التحصين المعزز: على عمر ١٦ - ١٨ أسبوع.
- الديك الرومي:
- التحصين الأول: على عمر ٣ أسابيع أو أكثر.
- التحصين المعزز: على عمر ٢٠ - ٢٢ أسبوع.
- للحصول على مناعة جيدة يجب إعطاء لقاح حي فيروس النيوكاسل قبل إعطاء اللقاح الزيتي المعطل.

نصائح طريقة الإستخدام:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المطهرات.
- انتظر ليأخذ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل الاستعمال.
- رج العبوة جيدا قبل الاستعمال.

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبردا ($٣^{\circ}\text{م} - ٨^{\circ}\text{م}$).
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.
- يجب إستخدام اللقاح خلال ٨ ساعات بعد فتح العبوة.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف

المستهدفة:

تحصين الطيور السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص

الذي يقوم بحقن الحيوانات:

لللقاح لا يسبب مرض للإنسان و لكن يجب الإنباه من الحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

الإستخدام خلال فترة الوضع، الخصوبة:

يمكن أن يستخدم خلال فترة انتاج البيض.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي

بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا

لللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي

بيطري آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الزائدة:

احتمال حدوث تفاعل طفيف في موضع الحقن في حال حقن ضعفين التركيز من جرعة اللقاح المعتمدة.

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

معلومات إضافية:

لقاح معطل زيتي. يتم تحضير الفيروس في أجنة الدجاج الخالي من الأمراض (SPF) ويتم خلطه مع المواد المساعدة لإنتاج لقاح مستحلب.

التعبئة:

عبوات بلاستيكية سعة: ٣٠٠ مل (١٠٠٠ جرعة).

لإستعمال البيطري فقط.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac