



جوفاكلوست®

لقاح معطل معلق للحقن مضاد للأمراض الكلوستريرية

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى: المادة الفعالة:

كل جرعة تحتوي على كمية كافية من السموم المعطلة والبكتيريا الميتة المنتجة لسموم: كلوستريديم بيرفرجنز نوع (A, B, C & D) ≤ ١٠ وحدة دولية مضاد لسموم ألفا، ≤ ٥ وحدات دولية مضاد لسموم بيتا، ≤ ٥ وحدات دولية مضاد لسموم إبسيلون، كلوستريديم سيبتيكوم ≤ ٢,٥ وحدة دولية مضاد لسموم ألفا، كلوستريديم نوفيائي نوع (A & B) ≤ ٣,٥ وحدة دولية مضاد لسموم ألفا، كلوستريديم وحدة دولية مضاد لسموم سورديلي ≤ ١ وحدة دولية مضاد لسموم سورديلي، كلوستريديم شوفياي حماية ≤ ٩٠٪ -المكونات الأخرى: هيدروكسيد الألمنيوم: > ٤ ملغم / مل.

الإستبيات:

- يستعمل لقاح جوفاكلوست اللقاحية من مرض التسمم الدموي المعوي / الكلية الرخوة، الضربة المفاجئة في الحملان، الفرغرينا الغازية، المرض الأسود (التهاب الكبد التنكزي)، التهاب المعدة الرباعية في الحملان، الساق المنفجعة في الحيوانات المجترة (الأبقار، الإبل، الأغنام، الماعز).
- بدء الإستجابة المناعية، بعد ٢١ يوماً.
- مدة الحماية المناعية: على الأقل سنة.

مخاير الإستخدام:

يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

لا توجد.
إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

الأصناف المستهدفة:

الأغنام، الماعز، الأبقار، الجمال.

الجرعة:

- يحقن اللقاح تحت الجلد، ويفضل في منطقة الإبط للأطراف الأمامية الخالية من الشعر بالنسبة للأغنام و الماعز و منطقة الرقبة أمام الكتف مباشرة بالنسبة للأبقار و الإبل كالتالي:
حديثي الولادة والحملان: ١ مل
الأغنام و الماعز: ٢ مل
الأبقار و الإبل: ٥ مل

تحصين الحيوانات الكبيرة:

- التحصين الأول: تحصن بجرعتين الأولى على أي عمر والثانية بعد ٤-٦ أسابيع من التحصين الأول.

- التحصين الثاني: تحصن بجرعة واحدة سنوياً، ويفضل ٢-٣ أسابيع قبل بداية الولادات في القطيع للتأكد من الحصول على مستوى جيد من المناعة.

الجرعة الزائدة:

عند حقن جرعتين من جرعة اللقاح المعتمدة: لا توجد.

إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

معلومات إضافية:

لقاح كلوستريديم معطل متعدد التكافؤ لحماية الأبقار، الأغنام، الماعز، الإبل ضد الأمراض الكلوستريرية والتي تتسبب في نفوق الحيوانات المفاجن وبشكل عام فإن الوقاية من المرض يعتمد على الرعاية الصحية السليمة و التحصين بواسطة اللقاح.

التعبئة:

عبوات بلاستيكية سعة: ٥٠، ١٠٠، ٢٥٠ مل، ٥٠٠ مل.

للإستخدام البيطري فقط.

تحصين حديثي الولادة: - في الأغنام و الماعز:

- إذا كانت من امهات غير محصنة: تحصن بجرعتين الأولى على عمر أكبر من شهر والثانية بعد ٨-١٢ أسابيع من التحصين الأول.
- إذا كانت من امهات محصنة: تحصن بجرعتين الأولى على عمر ٧-٨ أسابيع والثانية بعد ٢-٤ أسابيع من التحصين الأول، لكني لا تتعارض مع الأجسام المناعية المنقولة من الأم.
- في صغار الأبقار و الإبل:
تحصن بجرعتين الأولى على عمر ٣ شهور والثانية بعد ٢-٤ أسابيع من التحصين الأول.

طريقة الإستخدام:

- رج اللقاح جيداً قبل الإستخدام.
- استخدم إجراءات التعقيم المعتادة.
- تجنب إجهاد الحيوان عند التطعيم.

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ ميبردا (٢م - ٨م°).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح بعد فتح العبوة: يجب إستخدام اللقاح خلال ٨ ساعات من فتح العبوة.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأنصاف

المستهدفة:

تحصين الحيوانات السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص

الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان و لكن يجب الإنتباه من الحقن العرضي.
في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.
الإستخدام خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:
يمكن أن يستخدم خلال فترة الحمل، الرضاعة، موسم التكاثر.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac