



جوفاكلوست ت و ب®

لقاح معطل معلق للحقن
مضاد للأمراض الكلوستريرية ومرض الباستيوريل

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- المادة الفعالة:
 - كل جرعة تحتوي على كمية كافية من السوموم المعطلة والمكتيريا المينة المنتجة لسوموم:
 - كلوستريديم بيرفرنجنز نوع (A, B, C & D) ≤ ١٠ وحدة دولية مضاد لسوموم ألفا، ٥ ≤ ١٠ وحدات دولية مضاد لسوموم بيتا، ٥ ≤ ١٠ وحدات دولية مضاد لسوموم إيسيلون، كلوستريديم سيبتيكوم ≤ ٢,٥ وحدة دولية مضاد لسوموم ألفا، كلوستريديم نوفياي نوع (A & B) ≤ ٢,٥ وحدة دولية مضاد لسوموم ألفا، كلوستريديم تيتاني (كزاز) ≤ ٢,٥ وحدة دولية مضاد لسوموم الكزاز، كلوستريديم سورديلي ≤ ١ وحدة دولية مضاد لسوموم سورديلي، كلوستريديم هيموليتيكوم (نوفياي نوع D) خالية ≤ ٨٠٪، كلوستريديم شوفياي حماية ≤ ٩٠٪.
 - باستوريليا ملتوسيدا عشرة (A:1,3/B:2,5/D:4) المعطلة حماية على الأقل $2 \log_{10}$ لكل عشرة ومنهيدا هيموليتيكا نوع A1 المعطلة حماية على الأقل $10 \log_{10}$.
- المكونات الأخرى:
 - هيدروكسيد الألمنيوم: > ٤ ملغم / مل.

يستخدم خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة: يمكن أن يستخدم خلال فترة الحمل، الرضاعة، موسم التكاثر.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى وأشكال التفاعل الأخرى:
لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي بيطري آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الزائدة:
عند حقن جرعتين من جرعة اللقاح المعتمدة: نادرة، في حال حدوث ردة فعل تحسسي للحيوان نتيجة التحسين ينبغي الحصول على المشورة البيطرية.

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:
يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقًا للمطلوبات المحلية.

معلومات إضافية:
لقاح معطل متعدد التكافؤ لحماية الأبقار، الأغنام، الماعز، الإبل ضد الأمراض الكلوستريرية ومرض الباستيوريل والتي تسبب في نفوق الحيوانات المفاجئ، وبشكل عام فإن الوقاية من المرض يعتمد على الرعاية الصحية السليمة و التحصين بواسطة اللقاح.

التعبئة:
عبوات بلاستيكية سعة: ٥٠ مل، ١٠٠ مل، ٢٥٠ مل، ٥٠٠ مل.

للإستخدام البيطري فقط.

- تحصين الحيوانات الكبيرة:
 - التحصين الأول: تحصن بجرعتين الأولى على أي عمر والثانية بعد ٤-٦ أسابيع من التحصين الأول.
 - التحصين الثاني: تحصن بجرعة واحدة سنويًا، ويفضل ٢-٦ أسابيع قبل بداية الولادات في القطيع للتأكد من الحصول على مستوى جيد من المناعة.
- تحصين حديثي الولادة:
 - في الأغنام و الماعز:
 - إذا كانت من امهات غير محصنة: تحصن بجرعتين الأولى على عمر أكبر من شهر والثانية بعد ٨-١٢ أسابيع من التحصين الأول.
 - إذا كانت من امهات محصنة: تحصن بجرعتين الأولى على عمر ٧-٨ أسابيع والثانية بعد ٢-٤ أسابيع من التحصين الأول، لكي لا تعارض مع الأجسام المناعية المنقولة من الأم.
 - في صغار الأبقار و الإبل:
 - تحصن بجرعتين الأولى على عمر ٣ أشهر والثانية بعد ٢-٤ أسابيع من التحصين الأول.

طريقة الإستخدام:

- رخ اللقاح جيداً قبل الاستخدام.
- استخدم إجراءات التعقيم المعتادة.
- تجنب إجهاد الحيوان عند التطعيم.

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبردا (٢°م - ٥°م).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح بعد فتح العبوة: يجب إستخدام اللقاح خلال ٨ ساعات من فتح العبوة.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأنصاف

المستهدفة:
تحصين الحيوانات السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:
غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان ولكن يجب الإلتباه من الحقن العرضي.
في حالة حدوث الحقن العرضي ، عليك مراجعة الطبيب.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac