



جوفيفاك®

لقاح حي مجفد للحقن من فيروس جدرى الضأن
المضعف المحضر من عترة RM-65.

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- المادة الفعالة:
- تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد على الأقل على 2.0x10⁶ TCID₅₀ من جدرى الضأن المضعف المحضر من عترة RM-65.
- المكونات الأخرى:
- كيتوبولوجيكل بيبتون، تريهالوز، حليب مجفد خالي النسم.

الإستيبابات:

يعطي لقاح جوفيفاك تحصين الأغنام ضد مرض جدرى الضأن.

مخاطر الإستخدام:

يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

نادرة جداً، قد تظهر ندبة صغيرة في مكان الحقن كردة فعل للقاح ولكنها تزول لاحقاً.
إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

الأصناف المستهدفة:

الأغنام.

الجرعة:

- الجرعة ١ مل لكل حيوان تحت الجلد؛ ويفضل في منطقة الإبط للأطراف الأمامية الخالية من الشعر على عمر ٣-٢ أشهر.
- يتم إعادة التحصين مرة أخرى سنوياً.

نصائح طريقة الإستخدام:

- استخدم إجراءات التعقيم المعتادة.
- بخض اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المظهورات.
- يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم المرفق مع اللقاح.
- يستخدم ٥٠ مل من المذيب لكل ٥٠ جرعة من اللقاح أو ١٠٠ مل من المذيب لكل ١٠٠ جرعة من اللقاح أو ٢٠٠ مل من المذيب لكل ٢٠٠ جرعة من اللقاح.
- يستخدم اللقاح المذاب فوراً (خلال ساعتين في ظروف باردة).

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياجات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبردا (٢م° - ٨م°).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يحفظ بعيداً عن تناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.
- يجب إستخدام اللقاح خلال ساعتين بعد اذبة اللقاح.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف

المستهدفة:

تحصين الحيوانات السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص

الذي يقوم بحقن الحيوانات:

لللقاح لا يسبب مرض للإنسان ولكن يجب الإلتباه من الحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

الإستخدام خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:

يتمكن أن يستخدم خلال فترة الحمل، الرضاعة، موسم التكاثر.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي بيطري آخر. يجب

اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي بيطري آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الزائدة:

في حال حقن ١٠ أضعاف التركيز المعتمد من اللقاح:

نادرة؛ قد تظهر ندبة صغيرة في مكان الحقن كردة

فعل للقاح ولكنها تزول لاحقاً.

إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للملتمطبات المحلية.

معلومات إضافية:

جدرى الضأن مرض فيروسي يصيب الأغنام ويتسبب بخسائر إقتصادية كبيرة في الدول التي يتواجد فيها.

يمتاز هذا المرض بظهور آفات الجدرى على جميع أجزاء

جسم الحيوان وعلى الأغشية المخاطية مع ارتفاع

في درجة حرارة الحيوان والتهاب الغدد الليمفاوية و

في بعض الحالات تظهر إصابات بالتهاب الرئوي. إن

إتخاذ الإجراءات الصحيحة والتحصين هما أفضل الطرق

لمكافحة جدرى الأغنام.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac